



ОГЛЯД КОЛЕКЦІЇ МОЛЮСКІВ КЛАСУ GASTROPODA, ПІДКЛАСУ CAENO GASTROPODA, РЯДУ NEOGASTROPODA (MOLLUSCA) МУЗЕЮ ПРИРОДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

Ірина МОСКАЛЕЦЬ

З 1989 року по теперішній час автором була проведена ревізія молюсків ряду Neogastropoda колекції Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Базова колекція була зібрана впродовж першої половини 19 сторіччя та активно поповнювалась впродовж другої половини 20-го та по теперішній час. Наразі географія зібраних мушель доволі широка та охоплює усі частини світу крім Антарктиди. У різні часи колекцію поповнювали Л. В. Корабельников, І. П. Москалець, І. П. Бондарев, О. М. Сумароков, О. Б. Фельдман. Є серед них доволі рідкісні зразки, такі як *Turbinella laffertii* Kilbura, 1975 та *Festilyria festiva* Lamarck, 1811 з Індійського океану (біля Сомалі), *Conus gloriamaris* Chemnitz, 1777 з Філіппінських островів та *Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1894 з Індійського океану (Мозамбик). Анований список мушель молюсків класу Gastropoda, підкласу Caenogastropoda ряду Neogastropoda складає 36 родин, 212 родів, 602 видів, 2855 екземплярів.

Ключові слова: червононогі молюски, анований список, Україна, музейні колекції.

Музей природи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, вул. Трінклера, 8, Харків, 61058, Україна; e-mail: imoskalets@gmail.com

Москалець І.: <https://orcid.org/0009-0009-7536-3205>

Review of the collection mollusk shells (Mollusca: Gastropoda), Subclass Caenogastropoda, order Neogastropoda, which deposited in Museum of Nature of V. N. Karazin Kharkiv National University

Moskalets I.

Since 1989 to the present, the author has conducted a revision of the mollusks of the order Neogastropoda of the collection of Museum of Nature of V. N. Karazin Kharkiv National University. The basic collection was assembled during the first half of the 19th century and was actively expanded during the second half of the 20th century and to the present day. Currently, the geography of collected shells is quite broad and covers all parts of the world except Antarctica. At different times, the collection was replenished by L. V. Korabelnikov, I. P. Moskalets, I. P. Bondarev, O. M. Sumarokov, O. B. Feldman. There are quite rare specimens among them, such as *Turbinella laffertii* Kilbura, 1975 and *Festilyria festiva* Lamarck, 1811 from Indian ocean (near Somalia), *Conus gloriamaris* Chemnitz, 1777 from Philippines and *Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1894 from Indian ocean (Mozambique). The annotated checklist of gastropods mollusk shells consists of 36 families, 212 genera, 602 species, 2855 specimens from Subclass Caenogastropoda order Neogastropoda.

Key words: gastropods, annotated checklist, Ukraine, museum's collection.

Museum of Nature of V. N. Karazin Kharkiv National University, Trinkler Str., 8, Kharkiv, 61058, Ukraine; e-mail: imoskalets273@gmail.com

Moskalets I.: <https://orcid.org/0009-0009-7536-3205>

Вступ

З 1989 по теперішній час автором була проведена ревізія молюсків класу Gastropoda колекції Державного Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. За результатами у 2025 році була започаткована серія статей – анованих каталогів з метою надати інформаційний доступ до колекційних матеріалів що зберігаються у музеї фахівцям-малакологам та широкому загалу. Перша робота охоплювала 2 674

екземплярів 231 виду підкласів Patellogastropoda, Neritimorpha та Vetigastropoda (Moskalets 2025).

Ця робота присвячена огляду виключно ряду Neogastropoda, колекція яких поповнювалась із різноманітних джерел та наразі представлена зразками малакофауни з усього світу. А саме, впродовж чисельних експедицій директор Музею природи (1975–1988 рр.) Л. В. Корабельников зібрав та подарував музею мушлі з різних морів та океанів, а саме, Охотського та Японського морів

(1962 р.), Північного моря (1971 та 1977 рр.), акваторій поблизу Нової Зеландії (1967 р.) та Австралії (1966, 1967 та 1969 рр.), Атлантичного океану (поблизу Сенегалу у 1971 р.), Індійського океану (Бенгальська затока у 1974 р. та біля о. Мадагаскар у 1977 р.) та біля Південної Африки (1981 р.). У 1978 та 1979 роках та згодом з 1980 по 1983 року колектив музею за участю нинішнього директора Р. Е. Лунячека організовував та проводив експедиції у Білому та Японському морях відповідно. Впродовж них було зібрано багато хребетних та безхребетних тварин, у тому числі і моллюсків родин Muricidae та Vuccinidae. Також, автором колекція була поповнена особистими зборами з Японського моря (1982–1983 рр.), В'єтнаму (2007 р.) та з півострову Крим (2010 р.). Під час експедиції у північні та далекосхідні моря у 1986 році старший науковий співробітник Інституту Південних морів к.б.н. І. П. Бондарев зібрав та подарував музею мушлі родини Vuccinidae, а також цінні зразки з родини Muricidae з Чорного моря у 2010 та 2012 роках. Невеличка кількість мушель зібраних на о. Куба у 1991 році була подарована музею д.б.н. О. М. Сумароковим. У 2004 році доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського університету к.б.н. А. Ю. Утевський поповнив колекцію мушлею з підродино Muricinae зібраної у затоці Лапатайя (Аргентина). З 1998 року по теперішній час багато мушель гарної якості у тому числі рідкісних було отримано в дар від колекціонера, мецената, депутата Верховної Ради О. Б. Фельдмана. Географія подарованих мушель доволі широка та охоплює усі частини світу, крім Антарктиди. Є серед них доволі рідкісні зразки, такі як *Turbinella laffertii* Kilbura, 1975 та *Festilyria festiva* Lamarck, 1811 з Індійського океану (біля Сомалі), *Conus gloriamaris* Chemnitz, 1777 з Філіппінських островів та *Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1894 з Індійського океану (Мозамбик).

Матеріали і методи

У каталог увійшли дані про моллюсків ряду Neogastropoda – загалом 2855 екземплярів, що належать до 602 видів 212 родів з 36 родин.

Колекційний матеріал зберігається у вигляді мушель (без рідини-фіксатора), тобто визначення проводили тільки за зовнішніми ознаками мушель.

Для визначення видової належності були використані відповідні визначники (Abbott, Dance 2000; Anistratenko et al. 2011; Kantor, Sysoiev 2007; Cernohorsky, 1976; Goto, Poppe 1992; Houart 1992, 1994; Fraussen, Terryn 2007; Mallard et al. 1973; Walls, Jerry 1978; Wilson 1994). Назви

видів та система наведено згідно з «Revised classification,...» (Bouchet, Rocroi 2017).

У анотованому списку наведена тільки інформація яка вказана на етикетках. Більшість мушель мають оригінальну географічну етикетку, усі оздоблені визначними етикетками, інвентарними номерами та занесені до інвентарної книги Музею природи. У разі коли географічна етикетка відсутня в каталозі наведено тільки кількість екземплярів.

Прийняті скорочення: вдсх. – водосховище

гл. – глибина

екз. – екземпляр

м. – мис

о. – острів

р. – ріка

сmt – селище міського типу

Результати та обговорення

Нижче наведений анотований каталог мушель моллюсків класу Gastropoda, підкласу Caenogastropoda, ряду Neogastropoda – 36 родин, 212 родів, 602 вида, 2855 екземплярів.

Підклас Caenogastropoda Cox, 1960

Ряд Neogastropoda Wenz, 1938

Надродина Muricoidea Rafinesque, 1815

Родина Muricidae Rafinesque, 1815

Підродина Coralliophilinae Chenu, 1859

Babelomurex Coen, 1922

Babelomurex armatus (Sowerby, 1912): (1 екз.) Філіппінські острови, 2012р. (від Фельдмана О. Б.).

Babelomurex basilium (Penna & Neme, 1978): (1 екз.) Атлантичний океан, Бразилія, штат Санта-Катаріна, 2008 р., гл. 300–350 м (від Фельдмана О. Б.).

Babelomurex gemmatus (Shikama, 1966): (1 екз.) Філіппінські острови.

Babelomurex japonicus (Dunker, 1882): (1 екз.) Японія, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Babelomurex nakayasui (Shikama, 1970): (1 екз.) Філіппінські острови, 2020 р. (від Фельдмана О. Б.).

Coralliophila H. Adams & A. Adams, 1853

Coralliophila erosa (Röding, 1798): (1 екз.).

Rapa Röding, 1758

Rapa bulbiformis Sowerby, 1870: (3 екз.) Індія, 1848 р.

Rapa rapa (Linnaeus, 1758): (1 екз.) Філіппінські острови, Palawan, Koron Is., 2013 р. (від Бондарева І.П.).

Підродина Muricinae Rafinesque, 1815

Bolinus Pusch, 1837

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758): (19 екз.) Середземне море, 1848 р.

Bolinus cornutus (Linnaeus, 1758): (1 екз.) Атлантичний океан, західна Африка, 1883 р.

- Chicomurex* Arakawa, 1964
- Chicomurex laciniatus* (Sowerby, 1841): (1 екз.) Філіппінські острови, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicomurex superbus* (Sowerby, 1889): (1 екз.) Філіппінські острови, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicomurex venustus* (Rehder & Wilson, 1975): (1 екз.) Філіппінські острови, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus* Montfort, 1810
- Chicoreus aculeatus* Lamarck, 1822: (1 екз.) Філіппінські острови, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus asianus* Kuroda, 1942: (4 екз.) 1848 р.; (1 екз.) Південний В'єтнам, Н'я Чанг, 03.2007 р., придбаний у рибалок (від Москалець І. П.).
- Chicoreus banksii* (Sowerby, 1841): (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus bourguignate* (Poiger, 1883): (2 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. та 2010 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus brevifrons* (Lamarck, 1822): (2 екз.); (1 екз.) Бразилія, 1999 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus brunneus* (Link, 1807): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Австралія, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.); (2 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) Південний В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus capucinus* (Lamarck, 1822): (3 екз.), 1848 р.
- Chicoreus cornucervi* (Röding, 1758): (1 екз.) північно-західна Австралія, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus loebecki* (Kobelt, 1879): (1 екз.) Філіппінські острови, 2012 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus microphyllus* (Lamarck, 1822): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Chicoreus miyokoae* (Kosuge, 1979): (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Chicoreus nobilis* Shikama, 1977: (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus orchidiflorus* Shikama, 1973: (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus ramosus* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Червоне море, 1970 р. (Лізогуб Н. Н); (2 екз.) Філіппінські острови, 1996 та 2000 р.р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) там же, 1997 р. (Єременко В. І.); (4 екз.).
- Chicoreus rosarius* (Perry, 1811): (1 екз.) Філіппінські острови, 2007 р. (Єременко В. І.).
- Chicoreus rossiteri* (Crosse, 1872): (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus saharicus* (Locard, 1897): (1 екз.); (1 екз.) західна Африка, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus saulii* (Sowerby, 1841): (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Chicoreus torrefactus* (Sowerby, 1841): (5 екз.) 1848 р.; (1 екз.) Австралія, 1997 р. (від Єременко В. І.).
- Chicoreus virgineus* (Röding, 1758): (2 екз.) Червоне море, 1970 р. (Лізогуб Н. Н); (1 екз.) Червоне море, 2014 р. (від Москалець І.П.).
- Haustellum* Schumacher, 1817
- Haustellum haustellum* Linnaeus, 1758: (7 екз.) Індійський океан, 1883 р.
- Hexaplex* Perry, 1810
- Hexaplex duplex* (Röding, 1758): (3 екз.) західна Африка, 1848 р.
- Hexaplex cichoreum* (Gmelin, 1791): (5 екз.) 1848 р.; (1 екз.) 2001 р. (від Лунячека Р.Е.).
- Hexaplex megacerus* (Sowerby, 1834): (1 екз.) Західна Африка, 2014 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Hexaplex rosarium* (Röding, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1996 р., 2014 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Hexaplex trunculus* Linnaeus, 1758: (8 екз.) Середземне море, 1848 р. та 1877 р.; (2 екз.) Адриатичне море, 1957 р.; (1 екз.) Адриатичне море, Югославія, біля міста Ульцин, 1978 р. (Макрідін).
- Hexaplex stainforthii* (Reeve, 1845): (2 екз.) Північна Австралія, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Hexaplex varius* (Sowerby, 1834): (1 екз.) Середземне море.
- Homalocantha* Mörch, 1852
- Homalocantha scorpio* Linnaeus, 1758: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Homalocantha secunda* (Lamarck, 1822): (1 екз.) 1848 р.; (1 екз.) Австралія, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Homalocantha zamboi* (Burch & Burch, 1960): (3 екз.) Філіппінські острови, 1998, 2000 та 2008 рр. (від Фельдмана О. Б.).
- Murex* Linnaeus, 1758
- Murex africanus* Pöder & Voker, 1988): (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Murex brevispina macgillivrayi* Dohrn, 1862: (1 екз.) північна Австралія, штат Квінсленд, 2005 р., сублітораль (від Фельдмана О. Б.).
- Murex carbonnieri* (Jousseau, 1881): (1 екз.) Червоне море, Суецький канал, 05.1975 р. (Ступіцька).
- Murexforskoehlii* (Röding, 1758): (1 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Murex pecten* Lightfoot, 1786: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р. (2 екз.) В'єтнам, 1996 та 2006 рр. (від Фельдмана О. Б.).
- Murex scolopax* Dillwyn, 1817: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р. (1 екз.) Філіппінські острови, 2004 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.)

Індійський океан, Оманська затока, 2010 р., на мілководді (Одужа О.).

Murex ternispina Lamarck, 1822: (1 екз.).

Murex trapa Röding, 1758: (15 екз.) Індійський океан, 1848 р. (1 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, Махабалипурам, 23.09.1974 р. (Корабельніков Л. В.); (3 екз.) В'єтнам, 1996 та 2006 рр. (від Фельдмана О. Б.); (21 екз.).

Murex troscheli Lischke, 1868: (1 екз.).

Muricanthus Swainson, 1840

Muricanthus radix (Gmelin, 1791): (1 екз.) 1848 р.

Naquetia Jousseau, 1880

Naquetia annandalei (Preston, 1910): (1 екз.) Філіппінські острови, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Naquetia cumingii (A. Adams, 1853): (1 екз.).

Naquetia triquetra (Born, 1778): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р. (1 екз.) Індійський океан, Сейшельські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Phyllonotus Swainson, 1833

Phyllonotus erythrostomus (Swainson, 1831): (2 екз.) Тихий океан, Мексика, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).

Phyllonotus pomum Gmelin, 1791: (8 екз.)

Карибське море, 1848 р.; (1 екз.) там же, 1996 р. (від Фельдмана О. Б.).

Phyllonotus regius Swainson, 1821: (1 екз.)

Карибське море, 1848 р.

Pterochelus Jousseau, 1880

Pterochelus acanthopterus (Lamarck, 1822): (1 екз.) Північна Австралія, 1998 р. (від Фельдмана О. Б.).

Pterynotus Swainson, 1833

Pterynotus alatus (Röding, 1758): (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).

Pterynotus aparrii D'Attilio & Bertsch, 1980:

(1 екз.) Філіппінські острови, Mindanao, Talikud Is., 2020 р. (від Москадець І.П.).

Siratus Jousseau, 1880

Siratus alabaster (Reeve, 1845): (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Siratus consueta (Verrill, 1950): (1 екз.) Карибське море, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Siratus perelegans (Vokes, 1965): (1 екз.) Карибське море.

Siratus pliciferoides (Kuroda, 1942): (1 екз.).

Vokesimurex Petuch, 1994

Vokesimurex cabriti (Bernardi, 1859): (1 екз.) Карибське море.

Vokesimurex chrisostoma (Soverby, 1834): (1 екз.) Карибське море, 1848 р.

Vokesimurex dolichourus (Ponder & Vokes, 1988): (1 екз.) Філіппінські острови, о. Сикихор, Enrique Villanulva, 2018 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vokesimurex kiiensis (Kira, 1959): (1 екз.) Філіппінські острови, 2001 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vokesimurex malabaricus (Smith, 1894): (1 екз.) Індонезія, 2021 р. (від Фельдмана О. Б.).

Підродина *Ocenebrinae* Cossmann, 1903

Acanthina Fischer von Waldheim, 1807

Acanthina monodon (Pallas, 1774): (1 екз.).

Eupleura H. Adams & A. Adams, 1853

Eupleura tampaensis (Conrad, 1846): (1 екз.)

Карибське море, Флорида, Chocologoskee, мулястий пісок, 2007 р. (від Фельдмана О. Б.).

Jaton Pusch, 1837

Jaton decussatus (Gmelin, 1791): (1 екз.)

Атлантичний океан, Ангола (від Фельдмана О. Б.).

Nipponotrophon Kuroda & Habe, 1971

Nipponotrophon gordon (Dall, 1913): (1 екз.)

Японія, південна частина о. Хонсю, 2020 р., гл. 250 м (від Фельдмана О. Б.).

Nucella Röding, 1798

Nucella freycineti (Deshayes, 1841): (11 екз.) о. Кунашир, 15.08.1974 р. (секція аквалангистіп XIII).

Nucella freycineti alabaster Pilsbry, 1902: (1 екз.) Японія, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Nucella heuseana (Dunker, 1882): (26 екз.)

Японське море, 1974 р.; (20 екз.) о. Шикотан, 1969 р. (секція аквалангистіп XIII); (41 екз.) Японське море, о. Попова, 1982 р. (експедиція Музею природи).

Nucella heuseana var. *elongata* Golikov et Kussakin, 1962: (1 екз.) о. Шикотан, 1969 р. (Перевалов); (9 екз.) о. Сахалін.

Nucella lapillus (Linnaeus, 1767): (4 екз.) 1848 р.

Nucella lima (Gmelin, 1791): (1 екз.) о. Кунашир, 15.08.1974 р. (секція аквалангистіп XIII).

Ocenebra Leach, 1847

Ocenebra erinacea (Linnaeus, 1758): (8 екз.) Європа, 1848 р.

Ocenebrellus Jousseau, 1880

Ocenebrellus inornatus (Recluz, 1851): (2 екз.) Японське море, затока Пос'єта, 2006 р., гл. 6–7 м (від Єременко В. І.); Японське море, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Trophon Montfort, 1810

Trophon geversianus (Pallas, 1774): (1 екз.) Аргентина, Вогняна Земля, Lapataia Bay, 24.03.2004 р. (Утевський А. Ю.); (1 екз.) південь Чілі, 2012 р. (від Фельдмана О. Б.).

Trophon geversianus var. *acordonates* Castellanos, 1993: (1 екз.) Аргентина, Pr. Tierra del Fuego, Punta María, 35 km S. Rio Grande (від Фельдмана О. Б.).

Trophon geversianus var. *lamellosa* Castellanos, 1993: (1 екз.) Аргентина, Pr. Chubut, Peninsula de Valdes, Golfo San Jose, Playa Larralde, 6 m (від Фельдмана О. Б.).

Підродина Pagodulinae Barco, Schiaparelli, Houart & Oliverio, 2012

Boreotrophon Fischer, 1884

Boreotrophon candelabrum (Reeve, 1847): (2 екз.) о. Сахалін; (2 екз.) Японське море, 1982 р. (експедиція Музею природи); (1 екз.,) Японське море, затока Посьета, 2006 р. (Єременко В. І.).

Trophonopsis Bucquoy & Dautzenberg, 1882

Trophonopsis breviata (Jeffreys, 1882): (1 екз.) Чорне море, 2010 р., гл. 100 м (Бондарев І. П.).

Підродина Rapaninae Gray, 1853

Concholepas Lamarck, 1801

Concholepas concholepas (Bruguiere, 1792): (1 екз.) Чілі, IV Region of Coquimbo, Los Vilos, гл. 10–20 м, на камені, 2020 р. (від Фельдмана О. Б.).

Dicathais Macpherson & Gabriel, 1962

Dicathais orbita (Gmelin, 1791): (1 екз.).

Drupa Röding, 1798

Drupa morum (Röding, 1798): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) 2020 р. (від Фельдмана О. Б.).

Drupina Dall, 1923

Drupina grossularia (Röding, 1798): (1 екз.) Філіппінські острови, 2020 р. (від Фельдмана О. Б.).

Indothais Claremont, Vermeij, Williams & Reid, 2013

Indothais sacellum (Gmelin, 1791): (1 екз.).

Mancinella Link, 1807

Mancinella alouina (Röding, 1798): (3 екз.) 1848 р. У “Систематичному каталозі” (Sistematischeskij ... 1854) цей екземпляр був наведений як “*Purpura*

kammereri Кryn.” під порядковим номером 318, та вважався типовим екземпляром, але опис цього виду нами не був знайдений, скоріше за все не існує, та може вважатися *nomen nudum*. Впродовж ревізії він був перевизначений автором як *Mancinella alouina* (Röding) (Рис. 1, 2); (1 екз.) В’єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.).

Mancinella armigera Link, 1807: (1 екз.) 1848 р.

Menathais Iredale, 1937

Menathais tuberosa (Röding, 1798): (4 екз.) 1848 р.; (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).

Nassa Röding, 1798

Nassa francolinus (Bruguiere, 1789): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Nassa sarta (Bruguiere, 1789): (2 екз.) 1848 р.

Neorapana Cooke, 1918

Neorapana tuberculata (Sowerby, 1835): (5 екз.).

Plicopurpura Cossmann, 1903

Plicopurpura patula (Linnaeus, 1758): (5 екз.) Атлантичний океан, 1848 р. (2 екз.) Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі (Бочкарьова Н.); (1 екз.) о. Куба, Гавана, 1979 р. (Акуленко); (10 екз.) о. Куба, 18 км NE Гавани, 1991 р., на березі (Сумароков О. М.).

Purpura Bruguiere, 1789

Purpura bufo Lamarck, 1822: (2 екз.) 1848 р.

Purpura panama (Röding, 1798): (8 екз.) Карибське море; (1 екз.) там же, 2004 р. (від Фельдмана О. Б.).

Rapana Schumacher, 1817

Rapana rapiformis Born, 1778: (3 екз.)

Індійський океан, 1830 р.; (1 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А.Ф.).




Рис. 1. *Purpura kammereri* Кryn. L 49,3 мм (Фото Ю. Гуглі)

Fig. 1. *Purpura kammereri* Kryn. L 49,3 mm (Foto by Yu. Guglya)

Рис. 2. Сторінка із каталогу І. А. Криницького 1854 р. Родина Muricidae (Фото Ю. Гуглі)

Fig. 2. I. A. Krynytsky's catalog page. Familia Muricidae (Foto by Yu. Guglya)

Rapana venosa (Valenciennes, 1846): (2 екз.) Японське море, доставлені під час навколосвітньої подорожі на кліпері «Гайдамака», 1877 р. (Савченко П.Н.); (2 екз.) Чорне море, м. Ай-Тодор, 15.08.1959 р., гл. 14 м. (Мурахвері О.М.); (1 екз.) Азовське море, біля Бердянська, 08.1965 р. (Рудаєва А.В.); (8 екз.) Чорне море, 1978–1981 рр. (5 екз.) Чорне море, смт Партеніт, 08.2010 р., гл. 8–10 м (Москалець І.П.); (1 екз.) Чорне море, бухта Ласпи, 2012 р. (Бондарев І.П.).

Ricinella Schumacher, 1817

Ricinella rubusidaeus (Röding, 1798): (2 екз.) Червоне море, 1848 р.

Semiricinula von Martens, 1879

Semiricinula nodosa (Hombron & Jacquinot, 1848): (2 екз.) Атлантичний океан, 1977 р.

Sistrum Montfort, 1810

Sistrum ricinus (Linnaeus, 1758): (6 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Тайланд, 2002 р. (від Фельдмана О. Б.).

Stramonita Schumacher, 1817

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.; (1 екз.) Середземне море, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.).

Stramonita haemastoma floridana (Conrad, 1837): (3 екз.) Карибське море.

Thaisella Clench, 1947

Thaisella chocolata (Duclos, 1832): (1 екз.).

Thaisella coronata (Lamarck, 1819): (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.

Trochia Swainson, 1840

Trochia cingulata (Linnaeus, 1771): (2 екз.) 1848 р.

Tylothais Houart, 1937

Tylothais savignyi (Deshayes, 1844): (2 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А.Ф.).

Tylothais virgata (Dillwyn, 1817): (6 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Підродина Muricidae incertae sedis

Vitularia Swainson, 1840

Vitularia selebrosa (King, 1832): (1 екз.) Тихий океан, Мексика, штат Колима, біля міста Мансанільо, лагуна Teralcates, 2020 р., гл. 1–2 м (від Фельдмана О. Б.).

Надродина Buccinoidea Rafinesque, 1815

Родина Austrosiphonidae Cotton & Goldfrey, 1938

Penion Fischer, 1884

Penion chathamensis (Power, 1938): (1 екз.) Нова Зеландія, 1998 р. (від Фельдмана О. Б.).

Родина Babyloniidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971

Babylonia Schüter, 1832

Babylonia areolata (Link, 1807): (2 екз.) Китай, 1830 р.

Babylonia feicheni Shikama, 1973: (1 екз.)

Babylonia lutosa (Lamarck, 1819): (1 екз.).

Babylonia spirata (Linnaeus, 1758): (8 екз.) о. Цейлон, 1848 р.; (4 екз.) Індійський океан.

Babylonia zeylanica (Bruguiere, 1789): (1 екз.) Індійський океан.

Родина Buccinanopsidae Galindo, Puillandre, Lozouet & Bouchet, 2016

Buccinanops d'Orbigny, 1841

Buccinanops monilifer (Kiener, 1834): (1 екз.) Аргентина, Буенос-Айрес, 2014 р. гл. 30 м (від Фельдмана О. Б.)

Родина Buccinidae Rafinesque, 1815

Ancistrolepis Dall, 1895

Ancistrolepis vietnamensis Sirenko & Goryachev, 1990: (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Aulacofusus Dall, 1918

Aulacofusus brevicauda (Deshayes, 1832): (1 екз.) Курильські о-ви, 2008 р., гл. 180 м (Бондарев І. П.).

Buccinum Linnaeus, 1758

Buccinum baerii (Middendorff, 1848): (1 екз.) Курильські о-ви, 2005 р., гл. 150 м (від Фельдмана О. Б.).

Buccinum bayani Yousseau, 1883: (1 екз.) Японське море, 1986 р., гл. 120 м (Бондарев І. П.).

Buccinum cyaneum Bruguiere, 1789: (2 екз.) Баренцево море, смт Дальні Зеленці. 1963 р., на мілководді; (3 екз.) Біле море, о. Середній, 1979 р. (експедиція Музею природи).

Buccinum crenatum Golikov & Gulbin, 1977: (1 екз.) Курильські о-ви, 1986 р., гл. 60 м (Бондарев І. П.)

Buccinum middendorffi Vercauzen, 1882: (3 екз.) Охотське море, о. Кунашир, 1962 р. (Корабельніков Л.В.); (3 екз.) Охотське море, о. Сахалін, Анівська затока, 15.06.1989 р. (Сумароков О. М.).

Buccinum ochotense Middendorff, 1848: (1 екз.) о. Сахалін.

Buccinum ochotense timessum Bartsch, 1980: (1 екз.) Японське море, 1980 р. (експедиція Музею природи).

Buccinum osagawai Habe & Ito, 1968: (4 екз.) о. Сахалін, південна частина.

Buccinum percrassum Dall, 1886: (1 екз.) Японське море, 1966 р.

Buccinum sakhalinense Dall, 1907: (20 екз.) Японське море, о. Сахалін, південна частина, 1969 р.

Buccinum undatum Linnaeus, 1758: (2 екз.) Європа, 1848 р.; (4 екз.) Північне море, 1971 р. (Корабельніков Л.В.); (2 екз.) Біле море, о. Середній, 1978 р. (експедиція Музею природи); (4 екз.) Біле море, Чупінська затока, 1982 р., гл. 5–20 м (Чумихайло Є. А.).

- Buccinum verkrüzeni* Kobelt, 1882: (8 екз.) о. Сахалін, Татарська протока, смт Антоново, 1969 р. (секція аквалангістів ХГУ); (6 екз.) Японське море, 1983р. (Москлиць І. П.); (1 екз.) Охотське море, гл. 160 м (від Фельдмана О. Б.).
- Lussivolutopsius* Kantor, 1983
- Lussivolutopsius emphalicus* Dall, 1891: (1 екз.) Курильські о-ви, 1986 р. (Бондарев І. П.).
- Neancistrolepis* Habe & Sato, 1973
- Neancistrolepis beringianus* (Dall, 1919): (1 екз.) Охотське море, 1986 р., гл. 140 м (Бондарев І. П.).
- Neoberingius* Habe & Ito, 1965
- Neoberingius frielei* (Dall, 1895): (1 екз.) Охотське море, 1986 р., гл. 120 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea* Röding, 1798
- Neptunea arthritica* (Valenciennes, 1858): (9 екз.) о. Сахалін, Татарська протока, смт Антоново, 1969 р. (секція аквалангістів ХГУ); (12 екз.) Японське море, 1983 р. (експедиція Музею природи).
- Neptunea bulbacea* (Valenciennes, 1858): (2 екз.) Японське море, о. Сахалін, південна частина, 1969 р.
- Neptunea despecta* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Європа, 1848 р.; (1 екз.) Баренцево море, смт Дальні Зеленці, 1963 р.; (6 екз.) Біле море.
- Neptunea eulimata* (Dall, 1907): (1 екз.) Японське море, о. Сахалін, південна частина, 08.1962 р. (Корабельніков Л. В., Дукіна В. В.); (1 екз.) Охотське море, 1986 р., гл. 150 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea lamellosa* Golikov, 1962: (1 екз.) Курильські о-ви, 1986 р., гл. 200 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea lyrata* (Gmelin, 1791): (1 екз.) о. Сахалін, Татарська протока, смт Антоново, 1969 р. (секція аквалангістів ХГУ); (1 екз.) Японське море, о. Попова, 1980 р. (Черніков В. Ф.); (1 екз.) Японське море, 1983 р. (експедиція Музею природи); (1 екз.) Японське море, 1885 р., гл. 60 м (Москлиць І. П.); (1 екз.) Охотське море, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Neptunea ossaecata* Fraussen & Terry, 2007: (1 екз.) Беренгове море, 1986 р., гл. 100 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea polycostata* Scarlato, 1955: (2 екз.) Японське море, 1977 р. (Огуль Р.А.); (1 екз.) Курильські о-ви, 1986 р., гл. 90 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea rugosa* Golikov, 1962: (1 екз.) Курильські о-ви, 1986 р., гл. 50 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea tuberculata* (Yokoyama, 1929): (1 екз.) Охотське море, 1986р., гл. 50 м (Бондарев І. П.); (1 екз.) Охотське море, о. Сахалін, Анівська затока, 15.06.1989 р. (Сумароков О. М.).
- Neptunea varicifera* (Dall, 1907): (1 екз.) Охотське море, 1986 р., гл. 140 м (Бондарев І. П.).
- Neptunea vladivostokensis* (Bartch, 1929): (4 екз.) Японське море, о. Попова, 1983 р. (експедиція Музею природи); (1 екз.) там же (Москалиць І. П.); (1 екз.) Охотське море, 1986 р. (Бондарев І. П.).
- Plicifusus* Dall, 1918
- Plicifusus kroyeri* (Müller, 1842): (1 екз.) Японське море, 1966 р.; (1 екз.) Північне море, 1977 р. (Корабельніков Л. В.); (1 екз.) Охотське море, 1986 р., гл. 160 м (Бондарев І. П.); (1 екз.) Охотське море, 2021 р.
- Pseudolimesus* Habe & Sato, 1973
- Pseudolimesus ooides* (Middendorff, 1848): (2 екз.) Охотське море, Курильські о-ви.
- Volutharpa* Fischer, 1856
- Volutharpa ampullacea* (Middendorff, 1848): (1 екз.) Охотське море.
- Родина Colidae** Gray, 1857
- Colus* Röding, 1857
- Colus islandicus* (Mohr, 1786): (4 екз.) Північне море, 1971 р. (Корабельніков Л. В.).
- Родина Colubrariidae** Dall, 1904
- Colubraria* Schumacher, 1817
- Colubraria obscura* (Reeve, 1844): (1 екз.) Карибське море, Флоріда, 2010 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Colubraria nitidula* (Sowerby, 1833): (1 екз.).
- Родина Columbelloidea** Swainson, 1840
- Astyris* H. Adams & A. Adams, 1853
- Astyris lunata* (Say, 1826): (75 екз.) Карибське море, о. Ява, 1848 р.
- Columbella* Lamarck, 1799
- Columbella mercatoria* (Linnaeus, 1758): (16 екз.) Карибське море, Антильські о-ви, 1848 р.; (46 екз.) Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі (Бочкарьова Н.); (46 екз.) Карибське море.
- Columbella rustica* (Linnaeus, 1758): (10 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.; (4 екз.) Середземне море.
- Columbella rusticoidea* Heilprin, 1886: (11 екз.) Карибське море.
- Родина Cominellidae** Gray, 1857
- Cominella* Gray, 1850
- Cominella nassoides otakanica* Power, 1949: (1 екз.) Нова Зеландія, Північний Острів, 1967 р., гл. 150 м (Корабельніков Л. В.).
- Mitrella* Risso, 1826
- Mitrella ocellata* Gmelin, 1791: (7 екз.) Карибське море, о. Ява, 1848 р.
- Nitidella* Swainson, 1840
- Nitidella laevigata* (Linnaeus, 1758): (31 екз.) Карибське море, 1848 р.

- Nitidella nitida* (Lamarck, 1822): (87 екз.) Карибське море, Антильські о-ви, 1848 р.; (10 екз.) Карибське море.
- Parametaria* Dall, 1916
- Parametaria epamella* (Duclos, 1840): (4 екз.).
- Parvanachis* Radwin, 1968
- Parvanachis pygmaea* (Sowerby, 1832): (13 екз.) Карибське море.
- Pictocolumbella* Habe, 1945
- Pictocolumbella ocellata* (Link, 1807): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Pyrene* Röding, 1798
- Pyrene obtusa* (Sowerby, 1832): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Pyrene punctata* (Bruguere, 1789): (14 екз.) Індійський океан, східна Африка, 1848 р.
- Pyrene splendidula* (Sowerby, 1832): (1 екз.) Філіппінські острови, 2010 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Родина Fasciolaridae** Gray, 1853
- Apertifusus* Vermeij & Lyons, 2012
- Apertifusus frenguelli* (Carcelles, 1953): (1 екз.) Атлантичний океан, Аргентина, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Artuxis* Troschel, 1868
- Artuxis syracusana* (Linnaeus, 1758): (1 екз.) Середземне море, Європа, 1848 р.
- Cinctura* Hollister, 1957
- Cinctura branhamae* (Render & Abbott, 1951): (2 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Fasciolaria* Lamarck, 1799
- Fasciolaria tulipa* Linnaeus, 1758: (12 екз.) Антильські острови, 1848 р.; (2 екз.) Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі (Бочкарьова Н. В.).
- Filifusus* Snyder, Vermeij & Lyons, 2012
- Filifusus filamentosus* (Röding, 1798): (6 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Fusinus* Rafinesque, 1815
- Fusinus colus* (Linnaeus, 1758): (1 екз.); (2 екз.) В'єтнам, 1996 та 2006 рр. (від Фельдмана О. Б.).
- Fusinus forceps* (Perry, 1811): (1 екз.)
- Fusinus longissimus* (Gmelin, 1791) : (1 екз.) 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Fusolatirus* Kuroda & Habe, 1971
- Fusolatirus balicasagensis* (Bozzetti, 1997): (1 екз.).
- Latirolagena* Harris, 1897
- Latirolagena smaragdulus* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, Африка, 1848 р.
- Latirus* Montfort, 1810
- Latirus barclayi* (Reeve, 1848): (1 екз.) Австралія.
- Latirus gibbulus* (Gmelin, 1791): (2 екз.) 1848 р.
- Latirus polygonus* (Gmelin, 1791): (2 екз.) Індія, 1848 р.
- Lugubrilaria* Snyder, Vermeij & Lyons, 2012
- Lugubrilaria lugubris* (A. Adams & Reeve, 1847): (1 екз.).
- Lyonsifusus* Vermeij & Snyder, 2018
- Lyonsifusus ansatus* (Gmelin, 1791): (2 екз.) Карибське море.
- Marmofusus* Snyder & Lyons, 2012
- Marmofusus nicobaricus* (Röding, 1798): (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Marmofusus polygonoides* (Lamarck, 1822): (3 екз.) Червоне море, 1970 р., на березі (Лізогуб Н. Н.); (3 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Marmofusus tuberculatus* (Lamarck, 1822): (3 екз.) Індія, 1848 р.
- Opeastoma* Berry, 1958
- Opeastoma pseudodon* (Burrow, 1815): (1 екз.) Тихий океан, Мексика, 2012 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Peristernia* Mörch, 1852
- Peristernia forskalii* (Tapparone – Canefri, 1875): (1 екз.) Індійський океан, Аденська затока, 2010 р., гл. 40 м (від Фельдмана О. Б.).
- Peristernia nassatula* (Lamarck, 1822): (2 екз.) 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Pleuroploca* Fischer, 1884
- Pleuroploca trapezium* (Linnaeus, 1758): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Polygona* Schumacher, 1817
- Polygona filosa* (Schubert & Wagner, 1829): (1 екз.) Західна Африка, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.); (2 екз.).
- Polygona infundibulum* (Gmelin, 1791): (2 екз.) Карибське море, 1830 р.
- Propefus* Iredale, 1924
- Propefus australis* (Quoy & Gaimard, 1833): (4 екз.) Австралія, затока Карпентарія, 1969 р. (Корабельніков Л.В.).
- Sinistralia* H. Adams & A. Adams, 1853
- Sinistralia maroccensis* (Gmelin, 1791): (4 екз.) Карибське море, Антильські острови, 1848 р.
- Triplofus* Olsson & Harbison, 1953
- Triplofus giganteus* (Kiener, 1840): (1 екз.) Карибське море.
- Triplofus princeps* (Sowerby, 1825): (1 екз.) Карибське море.
- Родина Nassariidae** Iredale, 1916
- Anentome* Cossmann, 1901
- Anentome helena* (von dem Busch, 1847): (25 екз.) з культури, 2020 р. (Дрогваленко О.М.).
- Antillophos* Woodring, 1928

- Antillophos grateloupianus* (Petit de la Saussaye, 1853): (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1971 р. (Корабельніков Л. В.).
- Bullia* Gray, 1833
- Bullia digitalis* (Dillwyn, 1817): (1 екз.) Африка, 1848 р.
- Bullia globulosum* (Kiener, 1834): (1 екз.) Аргентина, 2014 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Bullia mauritiana* Gray, 1839: (4 екз.) південна Африка, м. Доброї Надії, 2015 р., на березі (Фельдман О. Б.).
- Bullia sendersi* Kilburn, 1978: (1 екз.) Кенія.
- Bullia tenuis* Reeve, 1846: (1 екз.) південна Африка, 1848 р.
- Bullia tranquebarica* (Röding, 1798): (4 екз.) Аравійське море, 1848 р.
- Bullia vittata* (Linnaeus, 1758): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Cyllene* Gray, 1834
- Cyllene lamarcki* Chernohorsky, 1975: (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал.
- Demoulia* Gray, 1838
- Demoulia obtusata* (Link, 1807): (1 екз.) Африка.
- Nassaria* Link, 1807
- Nassaria acuminata* (Reeve, 1844): (2 екз.) Індійський океан, Аденська затока, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Nassaria coromandelica* Smith, 1894: (1 екз.).
- Nassaria recurva* Sowerby, 1859: (1 екз.).
- Nassarius* Dumeril, 1805
- Nassarius albescens* (Dunker, 1846): (1 екз.).
- Nassarius arcularis* (Linnaeus, 1758): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius arcularis plicatus* (Röding, 1798): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius bellulus* (Adams, 1852): (1 екз.) Філіппінські острови, 2020 р. (від Москалець І. П.).
- Nassarius castus* (Gould, 1850): (5 екз.).
- Nassarius coronatus* (Bruguiere, 1789): (2 екз.) Індійський океан, східна Африка, о. Мадагаскар, 1977 р. (Корабельніков Л. В.).
- Nassarius crenatus* (Hinds, 1844): (1 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2007 р., отриманий від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius crenoliratus* (Adams, 1852): (1 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2007 р., отриманий від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius crenulatus* (Bruguiere, 1789): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius deshaysianus* (Issel, 1866): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius desmouloides* Sowerby, 1903: (1 екз.) південна Африка, порт Альфред, 2021 р., гл. 100 м (від Фельдмана О. Б.).
- Nassarius dorsatus* (Röding, 1798): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius elegantissimus* Shuto, 1969): (1 екз.) Філіппінські острови, 2020 р. (від Москалець І. П.).
- Nassarius frederici* (Mellvill & Stanen, 1901): (4 екз.) Індія, 2021 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Nassarius glans* (Linnaeus, 1758): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius jasksonianus* (Quoy & Gaimard, 1833): (1 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 03.2007 р., отриманий від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius livescens* (Philippi, 1849): (2 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2007 р., отримані від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius olivaceus* (Bruguiere, 1789): (1 екз.) 1848 р.
- Nassarius miga* (Bruguiere, 1789): (3 екз.) Африка, 1848 р.
- Nassarius papillosum* (Linnaeus, 1758): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nassarius quadrasi* (Hidalgo, 1904): (3 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2007 р., отримані від рибалок (від Фельдмана О. Б.).
- Nassarius succinetus* (Adams, 1852): (2 екз.) В'єтнам, 2020 р., отримані від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius variciferus* (Adams, 1852): (2 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2020 р., отримані від рибалок (від Москалець І. П.).
- Nassarius vinctus* (Marrat, 1877): (1 екз.) південна Африка, 1848 р.
- Naytia* H. Adams & A. Adams, 1853
- Naytia granulosa* (Lamarck, 1822): (1 екз.) західна Африка, Гана.
- Oligohalinophila* Neiber & Glaubrecht, 2019
- Oligohalinophila dorri* (Watterbled, 1886): (2 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 03.2007 р., отримані від рибалок (від Москалець І. П.); (6 екз.) там же, 2020 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Phos* Montfort, 1810
- Phos muriculatus* Sowerby, 1859: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Phos roseatus* Hinds, 1844: (3 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Phos senticosus* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Tritia* Risso, 1826
- Tritia mutabilis* (Linnaeus, 1758): (10 екз.) Середземне море, 1848 р.
- Tritia lima* (Dillwyn, 1817): (1 екз.) Середземне море.
- Tritia pellucida* Risso, 1826: (1 екз.) Чорне море, узбережжя Кара-Дага, 1965 р. (Якушенко

Б. М.); (33 екз.) Чорне море, північне передмістя Мангалії, Сатурн, 22.07.1986 р., на березі (Жолудь Т. П.); (101 екз.) Чорне море, 1963 р.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758): (6 екз.) Європа, 1848 р.; (45 екз.) Чорне море, 1961 р., на березі (Колодько К. М.); (1 екз.) Чорне море, Севастополь, 1965 р. (Якушенко Б. М.); (7 екз.) Середземне море; (24 екз.) Чорне море; (1 екз.) Атлантичний океан, Португалія, Algarve Faro, Dosa de Recreiro, 06.2010 р., на мілководді (Шатровський О. Г.).

Родина Pisaniiidae Gray, 1857

Cantharus Röding, 1798

Cantharus erytostoma (Reeve, 1846): (1 екз.) Індонезія, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cantharus fumosa (Dillwyn, 1817): (1 екз.) Філіппінські острови, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cantharus melanostoma (Sowerby, 1825): (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cantharus traquebaricus (Gmelin, 1791): (1 екз.) південно-східна Азія, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.); (2 екз.) південно-східна Азія.

Cantharus undosa (Linnaeus, 1758): (1 екз.) пів-острів Малакка, 1848 р.; (3 екз.) південно-східна Азія.

Engina Gray, 1839

Engina mendicaria (Linnaeus, 1758): (2 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Engina spica Melvill & Standen, 1895: (1 екз.) Філіппінські острови, 1985 р. (від Бондарева І. П.).

Pisania Bivone e Bernardi, 1832

Pisania pusio Linnaeus, 1758): (5 екз.) Карибське море, 1848 р.

Polia Gray, 1834

Polia wagneri (Anton, 1839): (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Родина Prodotiidae Kantor, Fedosov, Kosyan, Puillandre, Sorokin, Kano, Clark & Bouchet, 2021

Clivipollia Iredale, 1929

Clivipollia pulchra (Reeve, 1846): (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Родина Prosiphonidae Powel, 1951

Austrofuscus Kobelt, 1879

Austrofuscus glans (Röding, 1798): (2 екз.) Нова Зеландія, Південний Острів, 03.11.1967 р. (Корабельніков Л. В.); (1 екз.) там же, 23.09.1974 р. (Корабельніков Л. В.); (1 екз.) Нова Зеландія, 2008 р., гл. 100 м (від Фельдмана О. Б.).

Neobuccinum Smitth, 1879

Neobuccinum eatoni (Smith, 1875): (1 екз.) 2005 р. (Бондарев І. П.).

Надродина Turbinelloidea Swainson, 1835

Родина Costellariidae MacDonald, 1860

Vexillum Röding, 1791

Vexillum cingulatum (Lamarck, 1822): (2 екз.) Індійський океан.

Vexillum citrinum (Gmelin, 1874): (2 екз.) Філіппінські острови, 1997 р. та 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vexillum coccineum (Reeve, 1844): (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vexillum curviliratum (Sowerby, 1874): (1 екз.) південний В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vexillum exasperatum (Gmelin, 1871): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (2 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 03.2007 р., отримані від риба-лок (від Москалець І.П.).

Vexillum formosense (Sowerby, 1889): (2 екз.) Філіппінські острови, 2007 р. (від Єременко В.І.).

Vexillum intermedium (Kiener, 1838): (2 екз.) 1848 р.

Vexillum lyratum (Lamarck, 1822): (1 екз.) Австралія, Тиморське море, риф Ашмор, 1967 р. (Корабельніков Л. В.).

Vexillum melongena (Lamarck, 1822): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Vexillum plicarium (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.; Філіппінські острови, 2001 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vexillum rugosum (Gmelin, 1871): (6 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Vexillum sanguisuga (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Vexillum subdivisum (Gmelin, 1871): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Vexillum taeniatum (Lamarck, 1811): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Vexillum unifasciatum (Wood, 1828): (1 екз.) Індійський океан, 1965 р. (Гринштейн Р. А.).

Vexillum vulpecula (Linnaeus, 1758): (5 екз.) Індійський океан, Азія, 1848 р.; (1 екз.) Австралія, Тиморське море, риф Ашмор, 1967 р. (Корабельніков Л. В.).

Родина Columbariidae Finlay, 1926

Coluzea Finlay, 1926

Coluzea radialis (Watson, 1882): (9 екз.) південна Африка, 1981 р. (Корабельніков Л. В.).

Родина Tudicidae Cossmann, 1901

Euthria Gray, 1850

Euthria cornea (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Північне море, 1833 р.

Tudicla Röding, 1798

Tudicla spirillus (Linnaeus, 1767): (4 екз.) Індійський океан.

- Родина Turbinellidae** Swainson, 1835
Syrinx Röding, 1798
Syrinx aruana (Linnaeus, 1758): (6 екз.) північна Австралія.
Turbinella Lamarck, 1811
Turbinella angulata (Lightfoot, 1786): (3 екз.) Карибське море.
Turbinella laffertii Kilbura, 1975: (1 екз.) Індійський океан, Мозамбик, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
Turbinella pyrum (Linnaeus, 1758): (5 екз.) Індійський океан, 1884 р.; (1 екз.) Індійський океан.
- Родина Vasidae** H. Adams & A. Adams, 1853
Globivasum Abbott, 1950
Globivasum capitellum (Linnaeus, 1758): (2 екз.) 1848 р.
Vasum Röding, 1798
Vasum ceramicum (Linnaeus, 1758): (1 екз.) Індонезія, Молукські острови, 1848 р.; (1 екз.) Індонезія (від Фельдмана О. Б.).
Vasum turbinellus (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан; (8 екз.) там же, 1877 р.; (1 екз.) Індійський океан, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Vulutella Perry, 1810
Vulutella muricata (Born, 1778): (3 екз.) Карибське море, Антильські острови, 1848 р.
- Надродина Olivoidea** Latreille, 1825
Родина Ancillariidae Swainson, 1840
Amalda H. Adams & A. Adams, 1853
Amalda hinomotoensis (Yokoyama, 1922): (1 екз.)
Amalda tamillata (Hinds, 1843): (1 екз.) південний В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Amalda tankervillei (Swainson, 1825): (1 екз.) Карибське море.
Ancilla Lamarck, 1799
Ancilla chrysoma Kilburn, 1981: (1 екз.).
Ancilla cinnatomea Lamarck, 1801: (1 екз.) Індійський океан, південна Індія, 2020 р.
Ancillista Iredale, 1936
Ancillista velesiana Iredale, 1936: (1 екз.) Австралія, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
Anolacia Gray, 1857
Anolacia mauritiana (Sowerby, 1830): (8 екз.).
Eburna Lamarck, 1801
Eburna glabrata (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Карибське море, 1848 р.; (1 екз.) Карибське море, Венесуела, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.).
Eburna lienardii Bernardi, 1821: (1 екз.) Бразилія.
- Родина Bellolividae** Kantor, Fedosov, Puillandre, Bonillo & Bouchet, 2017
Jaspidella Olsson, 1956
Jaspidella jaspidea (Gmelin, 1791) (2 екз.) Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі (Бочкарьова Н. В.).
- Родина Olividae** Latreille, 1825
Agaronia Gray, 1839
Agaronia acuminata (Lamarck, 1811): (4 екз.) Африка, 1848 р.
Agaronia gibbosa (Born, 1778): (18 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (17 екз.) Індійський океан.
Agaronia hiatula (Gmelin, 1791): (6 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.
Felicioliva Petuch & Berschauer, 2017
Felicioliva peruviana (Lamarck, 1811): (4 екз.) Перу.
Oliva Bruguiere, 1789
Oliva annulata (Gmelin, 1791): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva amethystiana (Röding, 1798): (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
Oliva bulbosa (Röding, 1798): (13 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (6 екз.) Червоне море.
Oliva caerulea (Röding, 1798): (8 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva carneola (Gmelin, 1791): (33 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva elegans Lamarck, 1811: (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Oliva flammulata (Lamarck, 1811): (3 екз.) Африка, 1848 р.
Oliva fulgurator (Röding, 1798): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva glandiformis Marrat, 1871: (1 екз.) Африка, 1848 р.
Oliva guttata Fischer von Waldheim, 1808: (7 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva irisans (Lamarck, 1811): (5 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva incrassata (Lightfoot, 1786): (1 екз.) Перу.
Oliva lignaria fordii (Johnson, 1910): (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Oliva macleaya Duclos, 1840: (1 екз.) Індійський океан.
Oliva miniacea (Röding, 1798): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) 1984 р. (Макурін); (3 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
Oliva mustellina (Lamarck, 1811): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
Oliva oliva (Linnaeus, 1758): (94 екз.) Індійський океан, 1848 р.

- Oliva porphyria* (Linnaeus, 1758): (3 екз.) Південна Америка, 1848 р.
- Oliva reticularis* (Lamarck, 1810): (28 екз.) Карибське море, 1848 р.; (1 екз.) Карибське море, о. Куба (Антонов).
- Olivareticulata* (Röding, 1798): (10 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (2 екз.) Індонезія, о. Калімантан, 1990 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Oliva reticulata azona* Dautzenberg, 1927: (1 екз.) В'єтнам.
- Oliva sayana* Ravenel, 1834: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.;
- Oliva sericea* (Röding, 1798): (1 екз.).
- Oliva tigrina* Lamarck, 1811: (10 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (2 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Oliva tremulina* Lamarck, 1811: (16 екз.) Індійський океан, 1877 р.; (2 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Oliva tricolor* Lamarck, 1811: (12 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Oliva venulata* Lamarck, 1811: (7 екз.) Карибське море, 1848 р.; (1 екз.) Карибське море.
- Oliva vidua* (Röding, 1798): (15 екз.) Індійський океан, східна Індія, 1848 р.; (2 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Oliva vidua cincta* Dautzenburg, 1927: (7 екз.) Австралія, 1877 р.
- Olivancillaria* d'Orbigny, 1841
- Olivancillaria urceus* (Röding, 1798): (4 екз.) Бразилія.
- Olivella* Swainson, 1831
- Olivella floralia* (Duclos, 1853): (20 екз.) Карибське море.
- Olivella gracilis* (Broderip & Sowerby, 1829): (2 екз.) Карибське море.
- Olivella minuta* (Link, 1807): (150 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Надродина Volutoidea** Rafinesque, 1815
- Родина Cancellariidae** Forbes & Hanley, 1851
- Admete* Müller, 1842
- Admete viridula* (Fabricius, 1780): (4 екз.) північні моря, 1848 – 1877 рр.
- Bivetiella* Wenz, 1943
- Bivetiella similis* (Sowerby, 1833): (1 екз.) Середземне море.
- Cancellaria* Lamarck, 1799
- Cancellaria lyrata* Adams & Reeve, 1850: (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал (від Москалець І. П.).
- Cancellaria reticulata* (Linnaeus, 1767): (1 екз.) Атлантичний океан.
- Scalptia* Jousseume, 1887
- Scalptia mercadoi* Old, 1968: (1 екз.) Філіппінські острови, Bohol, Balicasag Is., 2015 р., гл. 60–80 м, tangle nets (від Москалець І. П.).
- Scalptia scalarina* (Lamarck, 1822): (1 екз.) В'єтнам, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Родина Cystiscidae** Stimpson, 1865
- Gibberula* Swainson, 1840
- Gibberula miliaria* (Linnaeus, 1758): (42 екз.) Середземне море, 1848 р.
- Gibberula punctillum* Gogas & Fernandes, 1988: (2 екз.) Гвінейська затока, Сан-Томе острови, 1992 р., на мілководді, на водоростях (від Фельдмана О. Б.).
- Persicula* Schumacher, 1817
- Persicula blanda* (Hinds, 1844): (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 2002 р.
- Persicula cingulata* (Dillwyn, 1817): (3 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.; (1 екз.) Сенегал, 1998 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Persicula cornea* (Lamarck, 1822): (1 екз.) Індійський океан.
- Persicula interruptolineata* (Mühlfeld, 1816): (3 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Persicula persicula* (Linnaeus, 1758): (4 екз.) західна Африка, 1848 р.
- Persicula tessellata* (Lamarck, 1822): (2 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Persicula weberi* Olsson & McGinty, 1958: (2 екз.) Карибське море, Панама, Bocas del Toro, 1994 р., гл. 6–9 м, песок (від Фельдмана О. Б.).
- Родина Marginellidae** Fleming, 1828
- Bullata* Jousseume, 1875
- Bullata matthewsii* (Mol & Turch, 1967): (1 екз.) Бразилія.
- Cryptospira* Hinds, 1844
- Cryptospira strigata* (Dillwyn, 1817): (1 екз.).
- Dentimargo* Cossmann, 1899
- Dentimargo eburneola* (Conrad, 1834): (1 екз.) Карибське море, Флоріда, Key West, 2000 р., гл. 0,9–1,2 м, на водоростях (від Фельдмана О. Б.).
- Glabella* Swainson, 1840
- Glabella faba* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.
- Marginella* Lamarck, 1799
- Marginella glabella* (Linnaeus, 1758): (5 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.
- Marginella helmatina* Rang, 1832: (2 екз.) Атлантичний океан, Африка.
- Marginella lamarcki* Boyer, 2004: (1 екз.) У «Систематичному каталозі... (1854 цей екземпляр був наведений як «*Marginella carnea* Ктуп.» під порядковим номером 529, та вважався типовим екземпляром, але опис цього виду нами не був знайдений, скоріше за все не існує, та може вважатися *nomen nudum*. Впродовж ревізії був пере-




Рис. 3 *Marginella carnea* Кryn. L 23,2 мм (Фото Ю. Гуглі)

Fig. 3. *Marginella carnea* Kryn. L 23,2 mm (Foto by Yu. Guglya)

Рис. 4. Сторінка із каталогу І. А. Криницького 1854 р. Родина Marginellidae (Фото Ю. Гуглі)

Fig. 4. I. A. Krynytsky's catalog page. Familia Marginellidae (Foto by Yu. Guglya)

визначений автором як *Marginella lamarcki* Boyer (Рис. 3, 4).

Marginella limbata Lamarck, 1822: (2 екз.) Атлантичний океан, Африка.

Marginella nebulosa (Röding, 1798): (4 екз.) Африка, 1848 р.

Marginella petitti Duval, 1841: (1 екз.).

Marginella rosea Lamarck, 1822: (9 екз.) Африка, 1848 р.

Prunum Herrmannsen, 1852

Prunum amygdala (Kiener, 1841): (1 екз.).

Prunum guttatum (Dillwyn, 1817): (4 екз.) Карибське море, Флоріда; (5 екз.) Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі (Бочкарьова Н. В.).

Prunum monile (Linnaeus, 1758): (33 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.

Prunum marginatum (Born, 1778): (5 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.

Prunum prunum (Gmelin, 1791): (2 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.

Volvarina Hinds, 1844

Volvarina albolineata (d'Orbigny, 1842): (1 екз.) Карибське море, Багамські острови, о. Ельютера, східна частина, пісок, під каменем, 2019 р. (від Фельдмана О. Б.).

Volvarina exilis (Gmelin, 1791): (2 екз.) Атлантичний океан, Сенегал, 1848 р.

Родина Volutidae Rafinesque, 1815

Підродина Amoriinae Gray, 1857

Amoria Gray, 1855

Amoria exoptanda (Reeve, 1849): (1 екз.) південна Австралія, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).

Amoria praetexta (Reeve, 1849): (1 екз.) Австралія, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).

Amoria undulata (Lamarck, 1804): (2 екз.) північна Австралія, затока Карпентарія, 1969 р., риболовецький траулер "Ван Гог" (Соколов); (1 екз.) Австралія, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Amoria zebra (Leach, 1814): (1 екз.) Австралія, 2001 р. (від Єременко В.І.).

Cymbiola Swainson, 1831

Cymbiola aulica Sowerby, 1825: (2 екз.) Філіппінські острови, 1997 р., 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cymbiola cathartiae Reeve, 1856: (1 екз.) Філіппінські острови, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cymbiola imperialis (Lightfoot, 1786): (1 екз.) 1848 р.

Cymbiola imperialis var. *robinsona* (Burch, 1954): (1 екз.) Філіппінські острови, 2004 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cymbiola malayensis Doute & Bail, 2000: (1 екз.) о. Калімантан, 2005 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).

Cymbiola nivosa f. *slender* (Lamarck, 1804): (1 екз.).

Cymbiola nobilis (Lightfoot, 1786): (1 екз.) 1877 р.; (1 екз.) Тайвань, 1999 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cymbiola nobilis f. *dwarf* (Lightfoot, 1786): (1 екз.) 1848 р.

Cymbiola vespertilio (Linnaeus, 1758): (6 екз.) Індійський океан, 1877 р.; (15 екз.) Австралія, 1884 р.; (2 екз.) Філіппінські острови, 2002 р. (від Фельдмана О. Б.).

Cymbiola vespertilio pellisserpentis (Lamarck, 1811): (1 екз.).

- Symbiolacca* Iredale, 1929
Symbiolacca puchra (Soweby, 1825): (1 екз.) Північно-східна Австралія, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Melo Broderip, 1826
Melo aethiopicus (Linnaeus, 1758): (1 екз.).
Melo amphora (Lightfoot, 1786): (1 екз.) Східна Індія, 1876 р.; (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Melo broderipii (Gray, 1833): (1 екз.) 1848 р.
Melo georginae (Gray, 1833): (1 екз.) 1848 р.
Melo melo (Lightfoot, 1786): (8 екз.) Індійський океан, 1875 р.; (15 екз.).
Melo umbilicatus Broderip, 1826: (2 екз.) 1848 р.
Volutoconus Crosse, 1871
Volutoconus bednalli (Brazier, 1878): (1 екз.) Північна Австралія, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).
Підродина Athletinae Pilsbry & Olsson, 1954
Athleta Conrad, 1853
Athleta abyssicola (Adams & Reeve, 1848): (9 екз.) Атлантичний океан, південна Африка, 1981 р. (Корабельніков Л. В.).
Athleta lutosa (Koch, 1948): (3 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.; (29 екз.) Атлантичний океан, Південна Африка, 1981 р. (Корабельніков Л. В.); (1 екз.) там же, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Підродина Calliotectinae Pilsbry & Olsson, 1954
Neptuneopsis Sowerby, 1898
Neptuneopsis gilchristi (Sowerby, 1898): (2 екз.) Атлантичний океан, південна Африка, 1981 р. (Корабельніков Л. В.)
Підродина Сумбіїнае Н. Adams & А. Adams, 1853
Adelomelon Dall, 1906
Adelomelon ancilla (Lightfoot, 1786): (3 екз.) Аргентина.
Adelomelon beckii (Broderip, 1836): (1 екз.) Атлантичний океан, Південна Америка.
Alcithoe Н. Adams & А. Adams, 1853
Alcithoe fissurata (Dell, 1963): (1 екз.) Нова Зеландія.
Symbium Röding, 1798
Symbium cucumis Röding, 1798: (1 екз.) західна Африка, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).
Symbium glans (Gmelin, 1791): (1 екз.) західна Африка, 1848 р.; (2 екз.) там же (Кожевнікова О. П.).
Symbium marmoratum Link, 1807: (4 екз.) західна Африка, 1848 р.
Symbium olla (Linnaeus, 1758): (4 екз.) західна Африка, 1848 р.; (1 екз.) Атлантичний океан, 1975 р., СРТМ Чорноморриба (Охотін В., Колесніков).
Symbium pepo (Lightfoot, 1786): (4 екз.) західна Африка, 1877 р.; (1 екз.) там же, 2005 р. (від Бондарева І. П.).
Symbium senegalense Marche-Marchad, 1978: (1 екз.) Західна Африка, 1848 р.; (1 екз.) Атлантичний океан, 1968 р. (Дмитренко).
Symbium souliei Marche-Marchad, 1974: (1 екз.) західна Африка, 1848 р.
Symbium tritonis (Broderip, 1830): (1 екз.) західна Африка, 1848 р.
Odontocymbiola Clench & Turner, 1964
Odontocymbiola americana (Reeve, 1856): (1 екз.) Карибське море, Бразилія, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
Odontocymbiola magelanica (Gmelin, 1791): (1 екз.) Аргентина.
Pachycymbiola Ihering, 1907
Pachycymbiola brasiliana (Lamarck, 1811): (2 екз.) Атлантичний океан, Південна Америка.
Provocator Wayson, 1882
Provocator mirabilis (Finlay, 1926): (1 екз.) Нова Зеландія, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
Provocator pulcher Watson, 1882: (1 екз.) Індійський океан, о. Каргелен, 2005 р. (від Бондарева І. П.).
Zidona Н. Adams & А. Adams, 1853
Zidona dufresnii (Donovan, 1823): (4 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.
Zidona dufresnii distincta (Latille, 1895): (2 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.
Підродина Fulgorariinae Pilsbry & Olsson, 1954
Fulgoraria Schumacher, 1817
Fulgoraria concinna (Broderip, 1836): (1 екз.) Японія, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
Fulgoraria ericanum Doute, 1997: (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).
Fulgoraria noduchii Hayashi, 1960: (1 екз.) Японія, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
Fulgoraria rupestris (Gmelin, 1791): (1 екз.) Тайвань, 1877 р.
Підродина Scaphellinae Gray, 1857
Ampula Röding, 1798
Ampula priamus (Gmelin, 1791): (1 екз.) Середземне море; (1 екз.) північна Африка, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
Scaphella Swainson, 1832
Scaphella junona (Lamarck, 1804): (1 екз.) Карибське море, 2009 р., від Фельдмана О. Б.).
Підродина Volutinae Rafinesque, 1815
Callipara Gray, 1847
Callipara kurodai (Kawamura, 1964): (1 екз.) південний В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Enaeta Н. Adams & А. Adams, 1853

- Enaeta cumingii* (Broderip, 1832): (1 екз.) Карибське море, Мексика, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Festilyria Pilsbry & Olsson*, 1954
- Festilyria festiva* Lamarck, 1811: (1 екз.) Індійський океан, Сомалі, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Harpulina* Dall, 1906
- Harpulina arausiaca* (Lightfoot, 1786): (1 екз.) о. Шрі Ланка.
- Harpulina lapponica* (Linnaeus, 1758): (1 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, Махабалипурам, 23.09.1974 р. (Корабельніков Л. В.).
- Harpulina lotoisi* (Valenciennes, 1863): (1 екз.) Південно-західна Індія, 2020 р.
- Lyrina* Gray, 1847
- Lyrina cloveriana* Weaver, 1963: (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Lyrina delessertiana* (Petit de la Saussaye, 1842): (2 екз.) Сейшельські острови.
- Lyrina mallicki* Ladd, 1975: (1 екз.) Філіппінські острови, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Lyrina mitraeformis* (Lamarck, 1811): (1 екз.) Південно-західна Австралія, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Simililyria* Bail & Poppe, 2001
- Simililyria queketti* (Smith, 1901): (1 екз.) Мозамбік, 2005 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Voluta* Linnaeus, 1758
- Voluta ebraea* Linnaeus, 1758: (2 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Voluta musica* Linnaeus, 1758: (6 екз.) Карибське море, Антільські острови, 1848 р.
- Voluta musica carneolata* Lamarck, 1822: (6 екз.) Карибське море, Антільські острови, 1848 р.
- Voluta musica thriarella* Lamarck, 1822: (4 екз.) Карибське море, Антільські острови, 1848 р.
- Voluta virescens* (Lightfoot, 1786): (1 екз.) Карибське море, Нікарагуа, 2002 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Надродина Mitroidea** Swainson, 1831
- Родина Mitridae** Swainson, 1831
- Domiporta* Chernohorsky, 1970
- Domiporta filaris* (Linnaeus, 1771): (1 екз.) Філіппінські острови, Samar Is., 1990 р., на мілководді (від Фельдмана О. Б.).
- Domiporta granatina* (Lamarck, 1811): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Fusidomiporta* Fedosov, Herrmann, Kantor & Bouchet, 2018
- Fusidomiporta suturata* (Reeve, 1845): (1 екз.)
- Isara* H. Adams & A. Adams, 1853
- Isara pele* (Chernohorsky, 1970): (1 екз.) Філіппінські острови, Surigo Is., 2001 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Mitra* Lamarck, 1798
- Mitra mitra* (Linnaeus, 1758): (6 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Mitra papalis* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Mitra strictica* (Link, 1807): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Nebularia* Swainson, 1840
- Nebularia chrysostoma* (Broderip, 1836): (1 екз.).
- Nebularia eremitarum* (Röding, 1798): (5 екз.) о.Тимор, 1848 р.
- Nebularia ferrugenea* (Lamarck, 1811): (2 екз.) 1848 р.
- Nebularia incompta* (Lightfoot, 1786): (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Neocancilla* Chernohorsky, 1966
- Neocancilla clatrus* (Gmelin, 1791): (1 екз.) Тиморське море, риф Ашмор, 07.05.1966 р. (Корабельніков Л.В.); (1 екз.) Філіппінські острови, 2002 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Neocancilla papilio* (Link, 1807): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Neotiara* Fedosov, Herrmann, Kantor & Bouchet, 2018
- Neotiara nodulosa* (Gmelin, 1791): (9 екз.); (1 екз.) Карибське море, Флоріда, 2010 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Probata* Sarasua, 1986
- Probata barbadensis* (Gmelin, 1791): (1 екз.) Карибське море, Америка, 1848 р.
- Pterygia* Röding, 1798
- Pterygia dactylus* (Linnaeus, 1767): (2 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, 1848 р.
- Quasimitra* Fedosov, Herrmann, Kantor & Bouchet, 2018
- Quasimitra cardinalis* (Gmelin, 1791): (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Strigatella* Swainson, 1840
- Strigatella aurantia* (Gmelin, 1791): (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Strigatella paupercula* (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Swainsonia* H. Adams & A. Adams, 1853
- Swainsonia casta* (Gmelin, 1791): (1 екз.) Індонезія, Молукський архіпелаг, о. Амбон, 1848 р.
- Надродина Conoidea** Fleming, 1822
- Родина Conidae** Fleming, 1822
- Conus abbas* Hwass, 1792: (1 екз.) 1848 р.
- Conus achatinus* Gmelin, 1791: (7 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).

- Conus adensis* Smith, 1891: (1 екз.) Індійський океан, Аденська затока, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus aemulus* Reeve, 1844: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus aequipunctatus* Dautzenberg, 1937: (1 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А.Ф.).
- Conus amadis* Gmelin, 1791: (5 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Тайланд, 2003 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus ambiguus* Reeve, 1844: (1 екз.) Африка.
- Conus ammiralis* Linnaeus, 1758: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus araneosus* Solander, 1786: (1 екз.) Індійський океан, 1831 р. (від Самсонова).
- Conus arhon* Broderip, 1833: (1 екз.) 1848 р.
- Conus aristophanes* Sowerby, 1857: (1 екз.) Філіппінські острови, 2018 р. (від Москалець І. П.).
- Conus arenatus* Hwass, 1792: (8 екз.) Філіппінські острови, 1877 р.; (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.); (1 екз.) В'єтнам, 2007 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus augur* Lightfoot, 1786: (2 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.); (1 екз.) 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus aulicus* Linnaeus, 1758: (1 екз.) 1848 р.
- Conus aurantius* Hwass, 1792: (3 екз.) 1848 р.
- Conus australis* Holten, 1802: (1 екз.) Філіппінські острови, 2018 р. (від Москалець І. П.).
- Conus bandanus* Hwass, 1792: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus barthelemyi* Bernardi, 1861: (1 екз.) Індійський океан, 2011 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus bengalensis* (Okutani, 1968): (1 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus betulinus* Linnaeus, 1758: (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Філіппінські острови, 1999 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus biliosus* (Röding, 1798): (4 екз.) Індійський океан, Сейшельські острови, 1848 р. (від Самсонова).
- Conus byssinus* (Röding, 1798): (6 екз.) західна Африка, 1848 р.; (1 екз.) західна Африка, 2013 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus capitaneus* Linnaeus, 1758: (8 екз.) Індійський океан, Африка, 1848 р.; (1 екз.) 2003 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus catus* Hwass, 1792: (1 екз.) 1848 р.; (2 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Conus chaldaeus* (Röding, 1798): (3 екз.) Азія, 1848 р.; (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.).
- Conus cinereus* Hwass, 1792: (1 екз.).
- Conus circumcisis* Born, 1778: (1 екз.) 2008 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Conus collisus* Reeve, 1849: (1 екз.).
- Conus coffeae* Gmelin, 1791: (1 екз.).
- Conus coronatus* Gmelin, 1791: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus coronatus* f. *aristophanes* Sowerby, 1857: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus daucus* Hwass, 1792: (1 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Conus distans* Hwass, 1792: (1 екз.) Індійський океан, схіна Індія, 1888 р.
- Conus ebraeus* Linnaeus, 1758: (9 екз.) Індійський океан, Азія, 1848 р.
- Conus eburneus* Hwass, 1792: (7 екз.) Індійський океан, схіна Індія, 1848 р.
- Conus episcopus* Hwass, 1792: (1 екз.) Китай, 1848 р.
- Conus epistomium* Reeve, 1843: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus ermineus* Born, 1778: (7 екз.) Атлантичний океан, 1848 р.
- Conus erythraeensis* (Reeve, 1843): (1 екз.) Червоне море.
- Conus ferrugineus* Hwass, 1792: (10 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus figulinus* Linnaeus, 1758: (9 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, Тарангамбаді, 1848р.; (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.).
- Conus flavidus* Lamarck, 1810: (2 екз.); (2 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А.Ф.).
- Conus fumigatus* Hwass, 1792: (2 екз.) Червоне море, 1848 р.
- Conus furnae* Rolan, 1990: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus generalis* Linnaeus, 1767: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (2 екз.) південний В'єтнам, Н'я Чанг, 2006 р., 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus geographus* Linnaeus, 1758: (6 екз.) Індійський океан, 1877 р.; (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.); (1 екз.) Індійський океан, Сейшельські острови, 1983 р. (Макурін); (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus genuanus* Linnaeus, 1758: (1 екз.).
- Conus glaucus* Linnaeus, 1758: (2 екз.) 1848 р.
- Conus gloriamaris* Chemnitz, 1777: (1 екз.) Філіппінські острови, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).

- Conus granulatus* Linnaeus, 1758: (2 екз.) Карибське море, Америка, 1848 р.
- Conus inscriptus* Reeve, 1843: (2 екз.) Червоне море, 1848 р.
- Conus imperialis* Linnaeus, 1758: (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Філіппінські острови, 2003 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus jiskelii* Weinkauff, 1873: (1 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus leopardus* (Röding, 1798): (1 екз.) Індійський океан, Сейшельські острови, 1983 р. (Макурін); (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus litoglyphus* Hwass, 1792: (5 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus litteratus* Linnaeus, 1758: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus lividus* Hwass, 1792: (9 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) о. Шрі-Ланка, 1970 р. (Перегрін Д.).
- Conus locumtenens* Blumenbach, 1791: (3 екз.) Індонезія, Молукський архіпелаг, 1848 р.
- Conus magus* Linnaeus, 1758: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Філіппінські острови, 2003 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus maldivus* Hwass, 1792: (1 екз.) Індійський океан, Мозамбік, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.); (1 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Conus marmoreus* Linnaeus, 1758: (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus mercator* Linnaeus, 1758: (4 екз.) Атлантичний океан, західна Африка, 1848 р.
- Conus miles* Linnaeus, 1758: (8 екз.) Індійський океан, схіна Індія, 1848 р.
- Conus miliaris* Hwass, 1792: (1 екз.) 1848 р.
- Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1894: (1 екз.) Індійський океан, Мозамбік, 1997 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus monachus* Linnaeus, 1758: (1 екз.); (1 екз.) В'єтнам, 2007 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus monile* Hwass, 1792: (3 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, 1848 р.
- Conus mus* Hwass, 1792: (3 екз.) Карибське море, Гваделупа, 1848 р.
- Conus mustellinus* Hwass, 1792: (1 екз.) південно-східна Азія, 1848 р. (1 екз.) Філіппінські острови, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus nussatella* Linnaeus, 1758: (1 екз.) 1848 р.
- Conus omaria* Hwass, 1792: (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus parius* Reeve, 1844: (1 екз.) 1848 р.
- Conus patricius* Hinds, 1843: (1 екз.) Карибське море, 1848 р.
- Conus pennaceus* Born, 1778: (3 екз.) південно-східна Азія, 1848 р.
- Conus pertusus* Hwass, 1792: (3 екз.) південно-східна Азія, 1848 р.; (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).
- Conus planorbis* Born, 1778: (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus pulcher* Lightfoot, 1786: (4 екз.) Атлантичний океан, західна Африка, 1848 р. (1 екз.) південно-західна Африка, 1997 р. (від Сергуладзе О.).
- Conus pulicaris* Hwass, 1792: (5 екз.) Індійський океан, 1874 р.
- Conus quercinus* Lightfoot, 1786: (5 екз.) Індійський океан, Бенгальська затока, 1848 р.
- Conus radiatus* Gmelin, 1791: (1 екз.) 1848 р.
- Conus regius* Gmelin, 1791: (5 екз.) Карибське море, Америка, 1848 р.
- Conus spectrum* Linnaeus, 1758: (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus spurius* Gmelin, 1791: (4 екз.) Карибське море, Америка, 1848 р.
- Conus stercusmuscarum* Linnaeus, 1758: (3 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus striatus* Linnaeus, 1758: (7 екз.) Індійський океан, 1883 р.
- Conus sulcatus* Hwass, 1792: (1 екз.) Філіппінські острови.
- Conus terebra* Born, 1778: (5 екз.) Індійський океан, 1848 р.
- Conus tessulatus* Born, 1778: (8 екз.) Індійський океан, 1883 р.; (1 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Conus textile* Linnaeus, 1758: (13 екз.) Індійський океан, схіна Індія, 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus textile neovicarius* da Motta, 1982: (1 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).
- Conus tinianus* Hwass, 1792: (1 екз.) південна Африка, 1848 р.
- Conus tulipa* Linnaeus, 1758: (7 екз.) Індійський океан, Африка, 1848 р.
- Conus varius* Linnaeus, 1758: (2 екз.) Індійський океан, Азія, 1848 р.
- Conus ventricosus* Gmelin, 1791: (4 екз.) Середземне море, 1848 р.
- Conus venulatus* Hwass, 1792: (1 екз.) 1848 р.; (1 екз.) західна Африка, 1996 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus vexillum* Gmelin, 1791: (8 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.); (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
- Conus vitulinus* Hwass, 1792: (1 екз.).

Conus virgo Linnaeus, 1758: (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).

Conus violaceus Gmelin, 1791: (1 екз.) Індійський океан, 2000 р. (від Фельдмана О. Б.).

Conus zeylanicus Gmelin, 1791: (7 екз.) Індійський океан, схіна Індія, 1848 р.

Родина Terebridae Mörch, 1822

Duplicaria Dall, 1908

Duplicaria duplicata (Linnaeus, 1758): (4 екз.) 1874 р. (отримана в обмін від Шабельського А. В.); (3 екз.) о. Калімантан, 2004 р., на мілководді (Фельдман О. Б.).

Cinguloterebra Oyama, 1961

Cinguloterebra commaculata (Gmelin, 1791): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Hastula H. Adams & A. Adams, 1853

Hastula cinerea (Born, 1778): (1 екз.)

Hastula hestica (Linnaeus, 1758): (3 екз.) Австралія, 1848 р.

Myurella Hinds, 1845

Myurella affinis (Gray, 1834): (2 екз.) 1848 р.

Myurella nebulosa (Sowerby, 1825): (1 екз.)

Myurellopsis Fedosov, Malcolm, Teryn, Gorson, Modica, Holford & Puillandre, 2020.

Myurellopsis undulata (Gray, 1834): (1 екз.) В'єтнам, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Oxumeris Dall, 1903

Oxumeris areolata (Link, 1807): (4 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Oxumeris dimidiata (Linnaeus, 1758): (5 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Oxumeris chlorata (Lamarck, 1822): (4 екз.) 1877 р.

Oxumeris crenulata (Linnaeus, 1758): (4 екз.) Індійський океан, 1883 р.; (1 екз.) Червоне море, 2002 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).

Oxumeris maculata (Linnaeus, 1758): (11 екз.) Тихий океан, 1877 р.

Oxumeris senegalensis (Lamarck, 1822): (1 екз.) Атлантичний океан, Сенегал (від Москалець І. П.).

Terebra Bruguiere, 1789

Terebra achates Weaver, 1960: (1 екз.)

Terebra cumingii (Deshayes, 1857): (4 екз.) Австралія, 1848 р.

Terebra babylonia Lamarck, 1822: (1 екз.) Червоне море, 2001 р., на мілководді (Ковальчук А. Ф.).

Terebra guttata (Röding, 1798): (1 екз.)

Terebra pretiosa Reeve, 1842: (1 екз.) Філіппінські острови, Surigao Is., 2001 р. (від Фельдмана О. Б.).

Terebra subulata (Linnaeus, 1758): (7 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Родина Clavatulidae Gray, 1853

Pusionella Gray, 1847

Pusionella nifat (Bruguiere, 1792): (1 екз.) Атлантичний океан, західна Африка, 2012 р. (від Фельдмана О. Б.).

Turricula Schumacher, 1817

Turricula javana (Linnaeus, 1767): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Родина Drilliidae Olsson, 1964

Drillia Gray, 1838

Drillia enna (Dall, 1918): (1 екз.) Філіппінські острови, 2012 р. (від Фельдмана О. Б.).

Родина Mandellidae Fischer, 1883

Propebela Iredale, 1918

Propebela harpularia (Couthouy, 1838): (1 екз.) Баренцево море, смт Дальні Зеленці. 1969 р., гл. 50–60 м (Мурахвері О. М.).

Родина Pseudomelatomidae Morrison, 1966

Aguilaria Taylor & Wells, 1994

Aguilaria subochracea (Smith, 1877): (1 екз.)

Antiplanes Dall, 1902

Antiplanes vinosa (Dall, 1874): (1 екз.) Японське море, 06.1982 р., гл. 80 м, ґрунт мулястий (Москалець І. П.).

Crassispira Swainson, 1840

Crassispira maura (Sowerby, 1834): (1 екз.) Карибське море.

Funa Kilburn, 1988

Funa jeffreysii (Smith, 1875): (1 екз.)

Inquisitor Hedley, 1918

Inquisitor rufovaricosus (Kuroda & Habe, 1971): (1 екз.) Філіппінські острови, N. Mindanao, N. of Dipolog, Aliguay Is., гл. 120 м, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Ptychobela Thiele, 1925

Ptychobela suturalis (Gray, 1838): (1 екз.) Австралія, 1848 р.

Родина Raphitomidae Bellardi, 1875

Tatcheria Angas, 1877

Tatcheria mirabilis Angas, 1877: (1 екз.) Філіппінські острови, 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Родина Turridae H. Adams & A. Adams, 1853

Annulaturris Powell, 1966

Annulaturris undosa (Lamarck, 1816): (1 екз.)

Lophiotoma Casey, 1904

Lophiotoma acuta (Perry, 1811): (1 екз.) 1877 р.

Polystira Woodring, 1928

Polystira albida (Perry, 1811): (1 екз.) Карибське море, Флорида, 1848 р.

Polystira tellea (Dall, 1889): (3 екз.)

Turris Batsch, 1789

Turris babylonia (Linnaeus, 1758): (2 екз.) Індійський океан, 1848 р.

Turris crispa (Lamarck, 1822): (3 екз.) Індійський океан, 1877 р.

Turris garnonsii (Reeve, 1843): (1 екз.)
Unedogemmula MacNeil, 1961
Unedogemmula martini (Tesch, 1915): (1 екз.).
Надродина Neogastropoda incertae sedis
Родина Harpidae Bronn, 1849
Harpa Röding, 1798
Harpa amouretta Röding, 1798: (4 екз.)
 Індійський океан, 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2006 р.
 (від Фельдмана О. Б.).
Harpa articularis (Lamarck, 1822): (2 екз.) 1848 р.
Harpa cabriti Fischer, 1860: (1 екз.) Індійський
 океан, Сомалі, Лас-Хорех (Білоусова).
Harpa costata (Linnaeus, 1758): (1 екз.)
 Індійський океан, Бенгальська затока,
 Tarangambadi, 1848 р.
Harpa crenata Swainson, 1822: (1 екз.) Тихий
 океан, західна Мексика, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
Harpa doris (Röding, 1798): (1 екз.) Атлантичний
 океан, західна Африка, 2008 р. (від Фельдмана О. Б.).
Harpa harpa Linnaeus, 1758: (5 екз.) Індійський
 океан, 1848 р.; (1 екз.) В'єтнам, 2006 р. (від
 Фельдмана О. Б.).
Harpa major Röding, 1798: (1 екз.) В'єтнам,
 2001 р. (від Лунячека Р. Е.); (1 екз.) В'єтнам,
 2006 р. (від Фельдмана О. Б.).
Harpa ventricosa (Lamarck, 1822): (4 екз.)
 Індійський океан, 1848 р.

Morum Röding, 1798
Morum matthewsi Emerson, 1967: (1 екз.) Brasil,
 Rio Grande do Norte, Natal, 2020 р., гл. 15 м (від
 Москалець І.П.).
Morum oniscus (Linnaeus, 1767): (1 екз.)
 Карибське море, Америка, 1848 р. (13 екз.)
 Карибське море, о. Куба, 1968–1973 рр., на березі
 (Бочкарьова Н. В.).
Morum watanabei Kosuge, 1981(1 екз.)
 о. Калімантан, 2004 р., на мілководді
 (Фельдман О. Б.); (1 екз.) Філіппінські острови,
 2009 р. (від Фельдмана О. Б.).

Висновки

Колекція мушель містить велику кількість екземплярів зборів середини 19 сторіччя. Отримані результати проведеної ревізії колекції ряду Neogastropoda музею природи свідчать про велику наукову цінність як порівняльного матеріалу при визначенні моллюсків світового океану, зважаючи на важкодоступність такого матеріалу з різних причин.

Подяки

Автор висловлює щирі подяки к.б.н. Юлії Гуглі (Харків, Музей природи) за виготовлення світлин до статті та допомогу у підготовці рукопису.

- ABBOTT, R. T., DANCE, S. P. (2000) *Compendium of Seashells*. E. P. Dutton, Inc. New York.
- ANISTRATENKO, V. V., KHALIMAN, Y.A., ANISTRATENKO, O. Yu. (2011) *Molluski Azovskogo moria*. Naukova dumka, Kyiv. (in Ukrainian)
- BOUCHET, P., ROCROIJ, P. (2017) Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. *Malacologia*, 61(1–2), 526.
- KANTOR, Yu. I., SYSOIEV, A. V. (2007) *Morskiye isolonovatyie briukhonogie moliuski Rossii*. Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, Moskva. (in Russian)
- CERNOHORSKY, W. O. (1976) *The Mitridae of the World*. Part I. The subfamily Mitrinae. *Indo-Pacific Mollusca*, 3(17), 273–528.
- GOTO, Y., POPPE, G. (1992) *Volutes*. Mostra Mondiale Malacologia. Italy.
- HOUART, R. (1992) The genus *Chicoreus* and related genera (Gastropoda: Muricidae) in the Indo-West Pacific. *Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle*, (A), 154, 188.
- HOUART, R. (1994) *Illustrated Catalogue of Recent Species of Muricidae Named Since 1971*. Verlag Christa Hemmen. Germany.
- FRAUSSEN, K., TERRY, Y. (2007) *A Conchological Iconography. The Family Buccinidae Genus Neptunea*. Hackenheim, Germany.
- MALLARD, D., ROBIN, A. (2005) *Fascioliariidae*. Museum du Coquillage. Les Sables d'Olonne, France.
- REHDER, H. A. (1973) The Family Harpidae of the world. *Indo-Pacific Mollusca*, 3(16), 207–274.
- WALLS, J. G. (1978) *Cone Shells: A Synopsis of the Living Conidae*. T.F.H. Publications, Neptune City, New Jersey.
- WILSON, B. (1994) *Australian Marine Shells*. Odyssey Publication, West Australia.
- MOSKALETS, I. P. (2025) Review of the collection mollusk shells (Mollusca: Gastropoda), Subclass Patellogastropoda, Subclass Neritimorpha, Subclass Vetigastropoda, which deposited in Museum of Nature of V.N. Karazin Kharkiv National University. *Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology*, 58, 133–142. (in Ukrainian) <https://doi.org/10.32782/1998-6475.2025.58.18>
- SYSTEMATYCHESKII KATALOG PREDMETAM, KHRANIASHCHYMSIA V ZOOLOGICHESKOM KABYNETIE IMPERATORSKAGO KHARKOVSKAGO UNIVERSITETA, po 1848 god (1854) V unyversytetskoj tyografii, Kharkov. (in Russian)

Дата першого надходження статті до видання: 28.02.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 20.03.2026

Дата публікації (оприлюднення) статті: 29.05.2026